


Junio



Mazo

Junio

Curva Barométrica

Mayo

Junio

Cassia lignonotica

Escala Fahrenheit

Mayo


Junio.

Curva Higrométrica

Junio.

10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 28 29 30

Curva Higrométrica



GRAL. P. ELIAS CALLES

MEXICO, D. F.

Materias fecales del día siete de Junio de 1933.

Régimen de prueba consecutivo a la administración de 25 gramos de aceite de ricino, el día 4, sostenido durante dos días; y constituido por ciento cincuenta gramos de carne asada a la parrilla, un platito de puré de papas, treinta gramos de mantequilla, dos huevos tibios, café con leche, atole de sagú (una taza), pan tostado, tortillas de harina tostadas, frutas y legumbres.

Examen macroscópico sin diluir la evacuación.-

Evacuación homogénea, blanda, en forma de cinta, no adherente, de color amarillo verdoso oscuro, de olor fétido, cubierta de moco amorfo, que la hace aparecer como barnizada.

Exámen macroscópico, después de dilución.-

No se ven restos macroscópicos de alimentos digeribles.

Contiene masas mucoides abundantes y moco concreto incluído de consistencia y aspecto de acitrón teñido en amarillo ocre.

Exámen químico.-

Reacción al tornasol muy ligeramente ácida.

Estercobilina contiene en cantidad menor que la normal.

Bilirubina no contiene.

Nucleoalbúmina y mucina contiene en abundancia.

No hay albúmina soluble.

Exámen microscópico.-

Muy abundantes restos celulósicos (membranas, vasos y envolturas de cereales.

No hay fibras musculares.

No hay gotitas de grasas neutras.

No hay grasas ácidas ni saponificadas.

Contiene escasas células de feculentos, llenas de almidón, abundan-

62

GRAL. P. ELIAS CALLES

MEXICO, D. F.


te almidón amorfo y almidón crudo.

Exámen bacterioscópico.-


Flora iodófila, teñida por el Lugol escasa.

Flora bacteriana en general, medianamente aumentada, predominando la proteolítica, sobre la sacarolítica.

El Sauzal. B.C. Junio 7 de 1933.


Dr. Melo.

v


Dr. Rueda Magro.

Materias fecales del día 7 de junio de 1933.

Régimen de prueba (consecutivo a la administración de 25 gramos de aceite de ricino, el día 4) sostenido durante dos días; y constituido por ciento cincuenta gramos de carne asada a la parrilla, un platito de puré de papas, treinta gramos de mantequilla, dos huevos tibios, café con leche, atole de sagú (una taza), pan tostado, tortillas de harina tostadas, frutas y legumbres.

Examen macroscópico sin diluir la evacuación.

Evacuación homogénea, blanda, de olor fétido, cubierta de moco amorfo, que la hace aparecer como barnizada.

Examen macroscópico, después de dilución.

No se ven restos macroscópicos de alimentos digeribles.

Contiene masas mucoides abundantes y moco concreto incluido de consistencia y aspecto de acitrón teñido en amarillo ocre.

Examen químico.

Reacción al tornasol muy ligeramente ácida.

Estercobilina contiene en cantidad menor que la normal.

Biluribina no contiene.

Nucleoalbúmina y mucina contiene en abundancia.

No hay albúmina soluble.

Examen microscópico.

Muy abundantes restos celulósicos (membranas, vasos y envolturas de cereales).

No hay fibras musculares.

No hay gotitas de grasas neutras.

No hay grasas ácidas ni saponificadas.

Contiene escasas células de feculentos, llenas de almidón, abundante almidón amorfo y almidón crudo.

Examen bacterioscópico.

Flora iodófila, teñida por el Lugol escasa.

Flora bacteriana en general, medianamente aumentada, predominando la proteolítica, sobre la sacarolítica.

65
junio 10 de 1933.

Emulsi6n homog6nea, color amarill6 rojizo (betabel)
espor6nea, ^{espumosa} de olor agrio. mezclada uniformemente
con moco fibrado amorfo.: reacci6n francamente
acida al
almid6n contiene en menor proporci6n que la vaca
del d6a 7.

flora ~~paraf6sa~~ amilol6tica mas desarrollada
que en la vaca del d6a 7.

68

10 de junio de 1933.

Evacuación homogénea, color amarillo rojizo (betabel) esponjosa, espumosa, de olor agrio, mezclada uniformemente con moco amorfo: reacción francamente ácida al almidón contiene en menor proporción que la evacuación del día 7. Flora amibilítica más desarrollada que en la evacuación del día 7.

11 de Junio. Reac ácida al Tornasol.

Evacuación homogénea, de consistencia blanda, uniformemente mezclada con moco fluido, no adherente a la raija que la contiene. Presenta gran cantidad de burbujas de gas. Color amarillo rojizo. (Betabel) olor acre muy penetrante.

Kastle-Meyer. - Negativa.

~~Triboulet~~ de esterco bovino

y Nucleo albuminoso

Lugol. = Almidón crudo

en muy escasa cantidad.

Ausencia de flora directamente coloreable por el iodo.

Flora amilolítica abundante.

Total

8/12
8/12
8/12

4191

11 de junio de 1933.

Reacción ácida al tornasol.

Evacuación homogénea, de consistencia blanda, uniformemente mezclada con moco fluido, no adherente a la vasija que la contiene. Presenta gran cantidad de burbujas de gas color amarillo rojizo (betabel) olor acre muy penetrante.

Kastle Mayer. - Negativa.

Triboulet . - de estercobilina y núcleo-albúminas.

Lugol - Almidón crudo en muy escasa cantidad.

Ausencia de flora directamente coloreable por el iodo.

Flora amibilfítica abundante.

13 de junio de 1933.

Evacuación homogénea en forma de cilindros delgados, de consistencia "fofa" color amarillo blanquecino (carbonato de cal), olor acre menos pronunciado que el de la evacuación anterior.

Contiene moco íntimo y uniformemente mezclado, también en menor proporción que el día 12.

Reacción al tornasol ligeramente ácida.

Contiene ligeros restos celulósicos, no contiene restos musculares, ni grasas, ni almidón en ninguna de sus formas.

Predomina la flora amibilítica con la particularidad de que no se bien los gérmenes directamente por el iodo (Lugol).

15^o Junio del 933.

29.85. 55 H. 74 F.

70 H. 68 T.

29.82 74 H 58 T.

= Junio 17-933.:

29.80. 54 H. 73° F.

74. H. 70° T.

Junio 16.

29.86

54 H

73° T

62. H

71° T

29.80

56 H

73°

64 H

62°

29.80.

58 H

71°

70

VI/13/33. Colico.

29.85 49. H. 72°

62 H. 70° ✓

29.80 56 H. 72°

94 H. 60° ✓

VI/14/33.

29.80 52 H. - 72°

74 H. - 66°

29.80 62 H. - 76°

74 H. - 64°

29.82 58 H. 73°

Junio 13 del 1933

71

Evacuación / mas gruesa en forma de cilindros delgados, de consistencia "fofa" color amarillos blanquecinos (Carbonatos de cal), olor acre / menos pronunciado que el de la evacuación anterior.

Contiene moco ~~intimamente~~ íntima y uniformemente mezclados, también en misma proporción que el día 12.

Reacción al tornasol ligeramente ácida.

Contiene ligeros restos celulares, no contiene restos musculares, ni grasas, ni almidón en ninguno de sus fondos. ~~Flora predominante:~~
Predominan los *Flora* amilobítica con la participación de otros.
No se tienen los germen directamente por el iodo (Lugol).

Junio 16 del 933.

72

Evacuación Purgativa, de consistencia normal.
en forma de cinta delgada, de color amarillo obscuro.
(matein colorante del jugo de uva), con depósitos
de Carbonato de Cal. No es viscosa ni contiene
moco como las evacuaciones anteriores. No adhiere
al recipiente.

Reacción al Tornasol. muy ligeramente ácida.

Difícil de diluir. No se ven restos macroscópi-
cos de alimentos. Ni Moco intestinal, en nin-
guna de sus formas. ^{Examen microscópico: No contiene}
^{restos de almidón ni de celulosa}
^{Contiene Fibras musculares en su mayoría biogénicas}
^{cadav. Gotas grasositas del Eumen aceitoso.}
Flora bacteriana notablemente disminuida,
especialmente los Leptotrix y Streptotrix
que tanto abundaban en las Evacuaciones An-
teriores.

16 de junio de 1933.


Evacuación homogénea, de consistencia normal, en forma de cinta delgada, de color amarillo obscuro, (materia colorante del jugo de uva), con depósitos de carbonato de cal. No es viscosa ni contiene moco como las evacuaciones anteriores. No adhiere al recipiente.


Reacción al Tornasol, muy ligeramente acida.

Difficil de diluir. No se ven restos macroscópicos de alimentos, ni moco intestinal, en ninguna de sus formas.

Examen microscópico: no contiene restos de almidón ni de celulosa. Contiene fibras musculares en su mayoría bien atacadas. Gotas grasosas del enema aceitoso.

Flora bacteriana notablemente disminuida, especialmente los Leptotrix y Streptotrix que tanto abundaban en las evacuaciones anteriores.





76
17 de junio de 1933.

Reacción ligeramente ácida.

Examen microscópico: una que otra fibra muscular bien atacada. Flora bacteriana escasa. Ausencia de los leptotrix, tan abundantes en las evacuaciones de los días anteriores.

77

Reac. f. alcalin.
Evacuación homogénea, cilíndrica, co-
lor amarillo oro, no adherente a la
bacinilla, de olor ^{fecal} normal.

Examinado después de diluirlo, no se ven restos macroscópicos de almidón ni trozos de Carbónal y
Al microscopio: pocas esferas amorfas bien atacadas.
Estas, así como los pequeños fragmentos de Estercobilina en cantidad normal; no contiene bilirubina).

bi li rubrum),
Lugol (no hay almidón, ni celulosa)
Flor - bacteriana normal (ausencia
de Leptotrix y Streptotrix),

101

Junio 23 del 933
 Reac. ligeramente acida.
 Evaporación de color amarillo moreno
 obscuro (vino). Lugol (No hay
 almidón, masas amorfas de carbo-
 cal y escasas fibras musculosas
 bien atacadas.)
 Flora Bacteriana Normal.

72
21 de junio de 1933.

Reacción alcalina.

Evacuación homogénea, cilíndrica, color amarillo oro, no adherente a la bacinilla, de olor fecal normal.

Examinada después de diluida no se ven restos macroscópicos de alimentos ni moco. Al microscopio masas amorfas de carbonato de cal y escasas fibras musculares bien atacadas.

Triboulet. - Estercobilina en cantidad normal; no contiene bilirubina.

Lugol. - No hay almidón ni celulosa.

Flora bacteriana normal. (Ausencia de Leptotrix y Streptotrix).

23 de junio de 1933.

Reacción ligeramente ácida.

Evacuación de color amarillo moreno oscuro (vino).

Lugol - No hay almidón, masas amorfas de carbonato de cal y escasas fibras musculares bien atadas.

Flora bacteriana normal.

Junio 24 de 1933.

80

Examen del Evacuado.

Evacuación heterogénea, Consistiendo por una porción sólida en forma de cilindros delgados y otra líquida en abundante moco amorfo, en íntima mezcla. Color = amarillo oro, olor fecal pronunciado.

Reacción alcalina al Tornasol.

Examen Microscópico: Restos de alimentos; pequeñas masas de almidón crudo en escasos ~~cantidad~~ números.

Abundantes fibras musculares bien atacadas. No contiene grasas ni celulosa. Flora bacteriana abundante, con predominio de la Amibótica (Leptotrix, sarcinas, Clostridias y bacilos de Oppen-Boas).

= Junio 25 =

Examen de Reacción
ligamento acida.

En Moco.

al Examen microscopico se
observa que no hay fibras Mus-
culares; mas que otras pequeñas
masas de Almidón amorfo
no hay restos de celulosas; y
presenta la misma flora que la
Examen anterior (la del 24)

24 de junio de 1933.

Examen de la evacuación.

Evacuación heterogénea, constituida por una porción sólida en forma de cilindro delgado y otra líquida con abundante moco amorfo, en íntima mezcla. Color amarillo oro, olor fecal pronunciado.

Reacción alcalina al Tornasol.

Examen microscópico: restos de alimentos; pequeñas masas de almidón crudo en escaso número. Abundantes fibras musculares bien atacadas. No contiene grasas ni celulosa. Flora bacteriana abundante, con predominio de la amibiflora. (Leptotrix, sarcinas, Clostridias y bacilos de Oppenheimer).

22

25 de junio de 1933.

Evacuación de reacción ligeramente ácida.

Sin moco.

Al examen microscópico se observa que no hay fibras musculares; una que otra pequeña masa de almidón amorfo, no hay restos de celulosa; y presenta la misma flora que la evacuación anterior (la del 24).

Día 25 de junio de 1933.

Presión barométrica. 30 pulgadas "Tyco".

Temperatura.

Estado higrométrico.

Trabajo cerebral fatigante 0.

Emociones (persistente recuerdo de la enfermedad y operación de Leonor, películas en que figura)

Ejercicio. - Media hora de juego de billar.

Alimentación: 2 huevos, sopa cola de res, filete a la parrilla, jamón, jugo de toronja y de naranja, totillas de maíz tostadas y café; infusiones de anís azucaradas.

Tabaco: fumó 3 cigarros.

Cognac: 3 copitas.

Evacuación fermentativa, adolorimiento abdominal generalizado, meteorismo (+++)

Sensación de ligadura en los miembros.

Astenia, depresión psíquica.

Durmió de las 2 a las 7 bajo la acción de una tableta de fanodormo.

Tratamiento:

Antiespasmódicos: 10 gotas de tintura de belladona a las 8 y 10 gotas a las 6 de la tarde. - Una tableta de eupaverina (0.03) a las 22 horas.

Medicación alcalina para saturar los ácidos de fermentación: una cucharadita de carbonato de cal a las 13 y otra a las 19 horas.

Medicación hipocrática: una tableta de fanodormo a las 1.30 de la mañana del 26. - 40 gotas pancreokinasa después de cada alimento.

Día 26 de junio de 1933.

	Mañana.	Noche.
P. barométrica.	29.96 pulgadas "Tyco"	29.90.
Temperatura.	64°F.	62°F.
Estado higrométrico.	68 "Yaylor"	74 h.

Peso - 151 libras.

Trabajo cerebral: despacho correspondencia.

Emociones: ninguna penosa.

Ejercicio: 10 minutos natación en el mar, 60 minutos marcha.

Alimentación: proteicos, huevos, pescado, carne de res; hidratos de carbono; jugos de frutas endulzados, azúcar, tortillas de maíz tostadas; grasas, manteca y mantequilla corta cantidad.

Tabaco: 6 cigarros; infusión de anís.

Cognac: una copita.

Otros licores: una copa de vino rojo.

Evacuación: no hubo evacuación.

Síntomas: reflectividad vascular apreciada por el oscilómetro a las 8 a.m.
(+) tensiones arteriales 10 1/2 Mx, 8 M, 6 Mn, índice tibiales 1/3 inf. pierna la. toma 2; 2a. toma 2 1/2.- meteorismo (++)

Durmió: de las 24 1/2 a las 8. Tomó una tableta de fanodormo.

Tratamiento: X gotas de tintura de belladona a las 8 y X gotas a las 18.
Una tableta de eupaverina de 0.03 a las 22 h. 10m.
1 tableta de fanodormo a las 24.
1 cucharadita cafetera de carbonato de cal a las 13 y otra a las 19.
40 gotas de pancreokinasa después de cada alimento.

Materias fecales del Sr.R.E.C.

Junio 27 de 1933.

Régimen de prueba:Ninguno especial.

Exámen macroscópico.-

Sin diluir:Evacuación homogénea,de consistencia chiclosa,de superficie brillante.,en forma de cilindros de diámetro aproximadamente normal,no adherente,de color amarillo moreno obscuro,de olor mezcla de acre y fétido.


Después de dilución:Evacuación difícil de diluir,no contiene restos macrocópicos de alimentos,ni productos patológicos de la mucosa intestinal.


Exámen químico:Reacción alcalina al tornasol.Bilirubina no contiene.Estercobilina en cantidad normal.Nucleoalbúmina y mucina contiene en cantidad normal.No hay albúmina soluble.No hay sangre.

Exámen microscópico:Esta evacuación se caracteriza por la gran cantidad de restos microscópicos de alimentos:fibras musculares en mediano número con ángulos rectos,y conservando su doble estricción;muy abundantes restos de almidón en sus tres formas:incluido en granos,amorfo y crudo;contiene grasas saponificadas.No contiene ácidos grasos,ni grasas neutras.

Exámen bacterioscópico:Flora iodófila:abundantes clostrídias.Flora bacteriana aumentada,con predominio marcado de la amilolítica.

El Sauzal.Baja California.Junio 27 de 1933.


Dr.Melo.


Dr.Rueda Magro.

Martes, 27 de junio de 1933.

	Mañana.	Noche.
P. barométrica.	29.95	29.95
Temperatura.	66° F.	66° F.
Estado higrométrico.	66 Humedad.	74 Humedad.

Reflectividad arterial: osc. apreciables desde 14 Mx 12 1/2 M 8 con índice oscilométrico de 6 Ms 5: a presión igual oscilaciones iguales.

Trabajo cerebral: despacho correspondencia, atención de recom. Gob. Arizona y de una comisión huelguistas de los Angeles.

Emociones: juego con sus amigos visitantes, situación aflictiva huelguistas California.

Ejercicio: 20 minutos natación en el mar.

Alimentación. - Huevos, pescado, palomas, jamón, jugos de fruta azucarados, infusiones azucaradas, café, tortillas de maíz tostadas.

Tabaco: numerosos cigarros.

Cognac: varias copitas cognac.

Otros licores: medio vaso vino rojo.

Síntomas: 1 evacuación líquida que no se examinó; gases +
Burmio de las 1.30 a las 7.30 (una tableta de fanodormo).

Tratamiento: XX gotas tintura de belladona a las 8 y XX gotas a las 18; una cucharadita cafetera de carbonato de cal a las 13 y otra a las 19; 40 gotas de Pancreokinasa después de cada alimento.
1 tableta de fanodormo a la 1.15. - enema con 100 gramos de aceite de olivas.

Miércoles, 28 de junio de 1933.

	Mañana.	Noche.
P. barométrica.	30 pulgadas "lycos"	29.94
Temperatura.	66° F.	64° F
Humedad.	68.	64 H.

Trabajo cerebral fatigante 0.

Emociones: felicitaciones por su onomástico.

Ejercicio 0.

Alimentación: patos, pescado, pavo, jamón, jugo de toronja azucarado, una naranja, infusiones azucaradas, tortillas de maíz tostadas.

Tabaco: varios cigarros.

Cognac: varias copitas de cognac.

Café: 3 tazas.

Otros licores: ninguno.

Síntomas: meteorismo + durmió desde las 5 hora en que se acostó hasta las 13 (fanodormo a las 5; una tableta).

Tratamiento: X gotas de tintura de belladona a las 8 y X a las 18, una cucharadita cafetera de carbonato de cal a las 13 y otra a las 19.30.

40 gotas de pancreokinasa después de cada alimento.
1 tableta de fanodormo a las 5.

Día 29 de junio de 1933.

	Mañana	Tarde.
P. barométrica.	29.95.	29.90.
Temperatura.	66°F.	62°F.
Humedad.	66	64.

Trabajo cerebral: conferencia 3 horas Riva Palacio.

Emisiones: ninguna (espera Gral. Cárdenas)

Ejercicio 0.

Tabaco: 3 cigarros.

Cognac: 2 copitas.

Vino rojo: una copa.

Café: 2 tazas.

Alimentos: pescado, jamón, huevos, jugos de toronja, dos naranjas, manteca, mantequilla, tortillas de maíz tostadas, infusiones de anís azucaradas.

Síntomas: meteorismo +; evacuación pastosa con moco blanquecino a las 4 1/2 durmió de las 2 a las 4 1/2 y de las 5 a las 7.

Tratamiento: X gotas de tintura de belladona a las 8 y X a las 19. Una cucharadita de carbonato de cal a las 14 y otra a las 20; 40 gotas de pancreokinasa después de cada alimento; una tableta de fanodormo a las 22, enema de 100 c.c. aceite de olivas tibio.

Día 30 de junio de 1933.

	Mañana.	Noche.
P. barométrica.	29.90	29.90
Temperatura.	66° F.	58° F
Estado higrométrico.	66 H.	74 H.

Trabajo cerebral: normal.

Emociones: intensas (película).

Ejercicio: visita a la huerta de naranjos.

Tabajo: cinco cigarros.

Cognac: 0.

Vino rojo: una copita.

Café: dos tazas.

Alimentos: huevos, pescado, filete de res, jamón, caldo, una cucharadita cafetera de arroz cocido al vapor, dos naranjas, jugo de toronja e infusiones de anís azucaradas.

Síntomas: gases ++, deseos de evacuar el intestino con frecuencia sin conseguirlo, hipertonia abdominal timpanismo exagerado, hipocondrio izquierdo a las 21.30 - durmió de las 22 a las 2 sin hipnótico, a esa hora gases ++++ tomó el fanodormo y no durmió sino unos momentos en la madrugada.

Tratamiento: 1 gotas tintura belladona a las 8 y 10 gotas a las 18, una cucharadita cafetera de carbonato de cal a las 13 y otra a las 20. Tableta de eupoverina de 0.03 a las 21.30. Fanodormo a las 2.

V. / 26. / 33

insomnia (3h.) epiconus arter (osc) ^{accedit hystera}
~~gaster~~ ^{gaster} ~~osc~~ ^{osc}

P.B 29.86 variable { S.H 52 interior { T 74. interior entire
74 intemp. { 60. intemperie miss
P.B 29.82 variable { S.H. 62 interior { T 70 interior frombidia
74 intemp { 59 intemperie. "

V. / 24. / 33

musculi 5 h. reflector arter - (on) acriodia
(osc)

29.84 variable { 3H 59 int { 74° interior
74 intemp. { 59° intemp. interior
29.88 variable { 9H 54 int { 72° interior
74 intemp { 56° intemp. interior
Sabado.

V. / 28. / 33.

incomis 6h. repl art menzases menos.

8.	29.90	{	S.H. 57 int	{	72° int	49	enters
			74 intemp		60 intemp		Carbon-
							Caolin
20.	29.90	{	54 int	{	74° int		miel
			74 intemp		58° intemp	48	Bromidin
	domingo						acete

V. / 29. / 33

des omnes (durum cum el dia 28) gases +++++

8.	29.92	{ 54. 55. interior. 74. intemperie. }	Temp. 73° interior. 62° intemperie.	entire
20	29.90	{ 54 56 interior 74 intemperie }	Temp 72° int 60° extemp.	cartons carlin miel bromelin codina.

V. 30/33

insomnio + + + + +

gases + + + + +

8	29.92	{	54 interior	{	74° interior	se supri nis el carbon y el carbon.
			74 intemperie		62° intemperie	
20	29.98	{	52 int	{	72° interior	pastilla car ante.
			74 intemperie		58 intemperie	

V. 31. / 33, durmis 5h.

gases +

8. 29.96	{ H. 50 int 54 intemp	{ 72° int 68° intemp	enteros larato coarctato pancreas nna.
20. 29.94	{ H. 46° int 74 intemp	{ 73° int 60 intemp	

VI. 1 / 33

inorm + (7h.)

gases +

8. 29.96	{ 50 int 62 intemp	{ 72° int 68 intemp	enteros mil acide pancreas.
20 29.94	{ 48 int 74° intemp	{ 70° int 58° intemp	

VI. 2 / 33

durmis 5h.

gases +

8. 29.94	{ 52 interior 58 intemp	{ 72° int 68° intemp	acide lactis mil lactona acide
20 29.84	{ 52 inter 74 intemp	{ 71° inter 63° ntemp	

VI. 3 / 33.

durmis 12h. sin
naches

gases +

8. 29.88	{ 48 inter 55° intemp	{ 72° int 65° intemp	acide lactis mil lactona acide pancreas ingest hys
20 29.99.	{ 52 H 57 H	{ 710 690	

VI/4/33 preocup. insomnis +++++
conf. aipy b. b.

gases +

8.	29.98	{ 52 H 57 H	71° 59°	purgante ricino bacteriofagi. dieta hídrica
20	29.95	{ 52 H 68 H	{ 71° 62°	

VI/5/33 insomnis + (durmió 9h.) espasmo. gases + +

Verde legumen
alimento de prueba

bacteriofago
miel, aceto
buro de mar
sulf, vacita
movida de
las huertas

8.	30.	52 H 72 H	72° T 62° T
20	29.90	48 H 74 H	72° T 56° T

confer. Melch. Ortega.
VI/6/33. cólico a las 22 horas.
durmió de 22.40 a 3.05 y de 3.30 a 8 am.

gases + + + +

8.	30.06	52 H 62 H	70° T 64° T	acid. láctico lactona miel
20 h.	30.00	52 H 74 H	72° T 58° T	sedol 1 amp. ^{4 las 22.45} bromh. 60. gotas a las 3.35 min

VI/7/33. durmió 7 horas. gases + + +
espasmo + + + +

intest

mejor
fosfat. ácido ^{1/2 canch}
de Horsford. ^{buro de}
~~ef. b. b.~~ ^{1 al}
fittalia

8.	30.	54 H 74 H	71° T 62° T
20.	29.92	52 H 74 H	72° T 58° T

VI. 8/33.

durmió 5 h.
jugó

gases +

8. 29.96.

58 H
74 H

72° T
62° T

ingol
ácido
fosfórico
belladona
pamita.

20 29.92

60 H
74 H

72° T
58° T

VI/9/33

durmió 6. horas
jugó

8. 29.90

52 H
74 H

74° T
60° T

ingol
ácido
fosfórico
belladona
pamita

20. 29.90

52 H.
74 H

72° T
60° T

VI/10/33.

cólico repentino surgiente a las 21 horas. inmed desp coma 1 pda jugo panino y pda carne y café con leche, baño de mar, visita puerta Br. Olacilla. frío y moralmente se sentía muy bien

8. 29.92

53 H
62° H

73° T
68° T

ingol
pamita.
fosfórico
belladona

20. 29.90

54 H.
72 H.

76° T
60° T

ingol sedol a las 21 horas 5. minutos.
tom. a las 11. formura
a las 3. formura las 5.

VI./11/33

durmió 7 h.

gases + + +

8 29.90

56 H
74 H

74°
66°

pamita
belladona 1 gto bis

20 29.86

58 H
74 H

74°
58°

ácido
tribromuro 2. tabletas

VI/12/33.

8 29.88

56 H
74 H

72°
60°

21 gto tribol en el día
pamita. - Carbonato
de ca 2 cuch en el día
2 tabletas tribromuro

20 29.86.

57 H
74 H

73°
58°

92
Día 25 de junio de 1933.

Presión barométrica. 30 pulgadas "Tyco"
Temperatura.
Estado higrométrico.

Trabajo cerebral fatigante 0.

Emociones (persistente recuerdo de la enfermedad y
operación de Leonor, películas en que figura)

Ejercicio: - Media hora de juego de billar.

Alimentación: 2 huevos, sopa de res, filete a la parrilla, jamón
fugos de naranja y de mandarina, tortillas de maíz tostadas y
tabaco. fumo 3 cigarros

Cognac. 3 copulās.

café, infu-
siones de virus
armados.

evacuación fermentativa, adolorimiento ab-
dominal generalizado, meteorismo (+++)

Sensación de ligadura en los miembros.

astenia, depresión psíquica.

durmió de las 2 a las 7 bajo la acción de
una lábula de fano dormo.

Tratamiento:

antiespasmódicos 10 gotas de tintura de belladona
a las 8 y 10 gotas a las seis de la tarde. - Una
lábula de euparcoma (0.03) a las 22 horas.

medicación alcalina para saturar los ácidos de
fermentación: una cucharadita de carbonato de
cal a las 13 y otra a las 19 horas.

medicación hipnótica. - una lábula de fano dormo a la 1.30
de la mañana del 26. - 40 gotas panorectinas a después c. alivando

93
día 26 de junio 1933

	Mañana	Noche.
P. barométrica	29.96 pulgadas "Tyzers"	29.90
Temperatura	64° F	62° F
estado higrométrico.	68. "Taylor"	74 h.

Peso = 151. libras

Tratamiento cerebral despacho correspondencia

emociones. ninguna penosa

ejercicio 10 minutos natación en el mar 60 minutos marcha.

alimentación proteicos, huevos, pescado, carne de res, hidratos de carbono; jugos de frutas endulzados azúcares, tortillas de maiz tostadas; grasas manteca y mantiguilla en la cantidad. tabaco 6 cigarros; infusión de anís

Cognac. una copula

Otros licores. una copa de vino rojo

evacuación no hubo evacuación

Síntomas: reflectividad vascular apreciada por el oscilómetro a las 8 am. (+) tensiones arteriales M_x M M_n $10\frac{1}{2}$, 8, 6.; índice tibiales $\frac{1}{3}$ inf piernas 1.ª toma 2; 2.ª toma $2\frac{1}{2}$; meteorismo (++)

duermis. de las $24\frac{1}{2}$ a las 8. tomó 1 tableta de panodromo

Tratamiento

8. gotas de tint de belladona a las 8 y 8. gotas a las 18.

una tableta de eufremina de 0.03 a las 22h.10m.

1. tableta de panodromo a las 24.

una cucharadita cafetera de carbonato de cal a las 13. y otra a las 19.

40. gotas de pancrea kinasa despues de cada alimento.

Miércoles 28 de junio 1933.

P.B.	Mañana	Noche.
	66° F	29.94
Temperatura	30 pulg - dos "Tyco"	64° F
Humedad.	68.	64 H.

Trabajo cerebral fatigante. 0.

Emociones felicitaciones por su onomástico.
Ejercicio 0.

Alimentación palao, pescado, pavo, jamon, jugo de
toronja picado, una naranja, infusiones de uva
das tortillas de maiz tostadas
tabaco varios cigarros
cognac varios copitos de cognac.
café 3 tazas
otros licores ninguno.

Síntomas. meteorismo + durmió desde las 5
hora en que se acostó las 13 (fue dormido a
las 5 una tableta)

Tratamiento. $\overline{X\frac{8}{4}}$ gotas de tint de belladona a las
8 y $\overline{X\frac{8}{4}}$ a las 18. una cucharadita cafetera de
carbonato de cal a las 13 y otra a las 19.30.
40. gotas de pancreosquinas después de cada
alimento.
1. tableta de fanodorma a las 5.

94

martes 27 de junio 1933.

	Mañana	Noche.
P. barométrica	29.95	29.95
Temperatura	66° F	63° F
estado higrométrico.	66. Humedad.	74 Humedad.

Reflexividad arterial: osc apreciables desde 14 Ux 12 1/2 Ux 8 con índice oscilom de 6 Ux 5: a presión igual oscilaciones iguales <sup>oscilo-
métrico</sup>

Trabajo cerebral despacho correspondencia, atención de Econ. Gob. Minora y de una comisión huelguistas de los Angeles.

Emociones juego con sus amigos visitantes, situación afectiva huelguistas California

Ejercicio 20 minutos natación en el mar

Alimentación. - huevos, pescado, palomas, jamón, jugos de fruta azucarados, infusiones azucaradas, café, tortillas de maíz tostadas

Tobaco. - numerosos cigarrillos

Cognac. - varias copitas Cognac.

Obislicores. - medio vaso vino rojo

Síntomas. - 1. evacuación líquida que no se examina;
gases +

dormir de las 1.30 a las 7.30 (una tableta de fano dormir)

Tratamiento. - XX. gotas tint de belladona a las 8 y XX. gotas a las 18; una cucharadita azucarada de carbonato de cal a las 13 y otra a las 19. 40. gotas de Pancreatina después de cada alimento.

1. tableta de fano dormir a la 1.15. - enema con 100 gramos de aceite de olivas.

junio 30./33.

P. B.	29.90	29.90
T	66° F	58° F
H.	66 H.	74 H.

Trabajo cerebral normal
Emociones intensas (película)
ejercicio. visita a la huerta de naranjos

tábaco: cinco cigarros

Cognac. 0

vinos rojos una copita

Café dos tésas

ejercicio

alimentos: huerros, pescado, filete de res, jamon, caldo
una cucharadita cafetera de arroz cocido al vapor, dos
naranjos, jugo de toronja e infusiones de anís azu-
caradas.

signos: gases ++, deseos de evacuar el intestino
con frecuencia sin conseguirlo, hipertonia abdominal
timpanismo exagerado, hipocondrio izquierdo a las
21.30. = durmió de las 22 a las 2 sin hipnotico
a esa hora gases ++++ tomó el jandorm y no
durmió sin unos momentos en la madrugada.

Tratamiento 2 gts tint belladona a las 8 y 10 gots a las 18, una cu-
charamita cafetera de carb de cal a las 13 y otra a las 20.
tableta de euforina de 0.03 a las 21.30.
jandorm a las 2.

96

junio 29./33.

	M	T
P. B.	29.95	29.90
T.	66°F	62°F
H.	66.	64

Tratado central ~~Correspondencia~~ 3h. Riv P.
Emociones ~~virginal~~ (espera Gral Cárdenas)
Ejercicio 0.

Caturo 3 cigarros
Cognac 2 copitas
vino rojo. una copa
café 2 tazas

alimentos: pescado, jamón, huevos, jugos de naranja,
dos naranjas, manteca, mantiguilla, tortillas de
maíz tostadas, infusiones de anís azucaradas.

Síntomas: meteorismo $\pm$ evacuación pastosa con
moco blagucino a las 4½ duermis de las 20 a las
4½ y de las 5 a las 7.

Tratamiento x. gotas de tintura de belladona a las
8 y 8 a las 19. una cucharadita de carbonato de
cal a las 14 y otra a las 20, 40. gotas de pancreo
kinasa después de cada alimento. una tableta de
fano dormo a las 22, suema de 100. cc. aceite de
olivas litio.

Julio 2 / 33.

P.B. ^M 29.95

T 64° F

H. 66.

Peso 150 libras

Tratamiento cerebral normal

Emociones normal

Ejercicio. marcha a pie por la plaza durante media hora.

Tobaco. - cuatro cigarrillos

Cognac. 0

Vino 0

Café dos tazas

alimentos: a las 9. dos huevos fritos y dos tortillas de maíz tostadas, a las 3 caldo desgrasado con pollo cocido, una paloma cocida, dos tortillas, un vaso pequeño de jugo de toronja.

Síntomas desde las diez dolor epigástrico soportable a las 14 lavado intestinal con agua hervida y una tableta de euforacina de 0.03 calor en el vientre. atenuación de los molestias para reaparecer.

intensas a las 19, reposo en cama, curación húmeda caliente, enema con aceite de olivas tibio, introducción de la sonda para gases. dolor + intenso epigástrico ahora con irradiación a la columna vertebral y al punto sub escapular pero del dolor al hipocóndrio en la región cística #

Julio 2 / 33.

P.B. ^M 29.95

T 64° F

H. 66.

Pesó 150 libras

Tratuj cerebral normal

Emociones normal

Ejercicio. marcha a pie por la playa durante media hora.

Tábaco. - cuatro cigarros

Cognac. 0

Vino 0

Café dos lázars

alimentos: a las 9. dos huevos fritos y dos tortillas de maíz tostadas, a las 3 caldo desgrasado con pollo cocido, una paloma cocida, dos tortillas, un vaso pequeño de jugo de toronja.

Síntomas desde las diez dolor epigástrico soportable a las 14 lavado intestinal con agua hervida y una tableta de euforacina de 0.03 calor en el vientre. atenuación de los molestias para reaparecer. intensos a las 19, reposo en cama, curación húmeda caliente, enema con aceite de olivas tibio, introducción de la sonda para gases. dolor + intenso epigástrico ahora con irradiación a la columna vertebral y al punto sub escapular paso del dolor al hipocóndrio en la región cística #

nauseas, pulso 60 por minuto, algunos entos
tableta de eufaricina de 0.03 a las 20 y 5
minutos y en vista del aumento rapido de
la intensidad del dolor inyeccion de una
ampollita de sedol a las 20 horas y 30 minutos
atenuacion a las 21 horas y sedacion hasta permitir
le dormir a las 21 horas 10 minutos.

julio 3./33.

	M	T
P. B.	29.98	29.94
T	64°	60°
H.	68.	72

Temperatura mental mediana

Emociones normal

Ejercicio físico 0

Tabaco 6 cigarros

Cognac. dos copitas

Vino rojo una copa

Café dos tazas

Alimentación: huevos, jamón la parte magra, pescado, filete, tortillas de maíz, espinacas, jugos de frutas, infusiones aromáticas.

Síntomas: reflectividad arterial exagerada, angioespasmo (reconocidos por el oscilómetro) diferencias marcadas de una toma a otra; índices variables a la misma presión en la misma toma, pulsatibilidad disminuida) pupilas y reflejos pupilares normales: vientre de tónica normal, no abultado, sensible a la presión en el hipocóndrio derecho y en el epigastrio en donde queda dolor espontáneo moderado, sensación de mareos después de la comida de mediodía.

Tratamiento: $\bar{X}$. gotas lent tellad. a las 8 y $\bar{X}$. a las 18, una tableta de euforéna después de comer y otra después de cenar, 40. gotas pancreokina a después de cada alimento.

P. B 29.94 29.96 julio 4. / 33.
 T 62° 62
 H 74 74

T central normal

Emisiones normal

Ejercicio físico: reposo en la cama.

tabaco 0.

cognac 0.

vinos rojos 0.

café 0.

alimento

9.30 jugo de toronja, 2 huevos tibios, una taza infusion de anis endulzada. a las 12.30 dos rebanadas de jamon, un vasito de jugo de naranja una taza de infusion de anis.

3.30 una taza consome, una porcion conejo asado al horno, un vasito jugo de naranja.

7.30 Una rebanada de jamon magro, un vasito de jugo de naranja, una taza de infusion de anis endulzada.

9.30 infusion de anis

Sintomas a las 3 horas dolor epigastrico fijo, con irradiacion al dorso, sin gran metorismo intestinal, acompañado de nausea y sensacion de hambre, puls 58 por minuto. Inyeccion de una ampolleta de sedol a las 3 y 7 minutos no siguió aumentando de intensidad, principio a atenuarse a las 3.47 minutos y a las 4 y 5 minutos se durmio sin quejarse durante el sueño. durmio de las 9 1/2 a las 11 1/2 tomo la tableta de fanodorm a la 1 y durmio hasta las 7.

11.30 cucharadita carbonato de cal

Medicamentos: 3.30 una tableta euparacena.

6.30 cucharadita carb. de cal.

9.30 tableta de euparacena.

tableta de fanodorm a la 1 del dia 5.

192

julio 5/33.

	M	T
P.B.	29.90	29.80
T	64°	58°
H.	74.	74.

T Cer. normal

Emoc. normal

Ej. Fis. 20 minutos de bellas

lábaco 0

cognac 1 copita

vinos rojo $\frac{1}{2}$ copa

café 0

alimentos. huevos, pollo, filete, jamon, 2 tortillas y media, manteguita, jugos de naranja y toronja.

Síntomas. dolor tenue pero persistente en el epigastrio, dolores en los m. inferiores hasta los dedos de los pies, gases +

M. fecales forma normal, consistencia normal, color amarillento normal, almidón 0. fibras musculares una que otra grasas 0. flora amilolítica normal

orina: color ambar, densidad 1.017 album. Neg. glucosa Neg. acetona Neg. indican Neg. bilis Neg. urobilina normal cilindros 0

Tratam. - una cuchar de jugo de ajo antes de c. alim.;
XXX gotas de pancreatina después de c. alimentos.
una cuchar de carb de cal y una amp de bacto intestinal. a las 12 y a las 19. una tableta de euforina a las 17 y otra a las 22.

julio 6/33.

P.P. M

29.80

T 60

H. 74

Tcer. normal

emroc. gastro - medias

E fis D.

tabaco 0

Cognac 3 copulas

vin rojo $\frac{1}{2}$ copa

cafe 0

alimentos, huevos, jamon, palomas, filete, jugos de frutas
6 trocitos de pan tostado, 4 tortillas, mantiguella, infu-
sion de aris azucarada

Sintomas.- depresion, ~~pesadiz~~ occipital dolor cervical
Tens. Ux $10\frac{1}{2}$ Ued 7, Uu 5 : reflectividad arterial con-
mentada.

a las 11 erac abundante = gases ++
insomnio durmio de las 11 a las 6 con una tableta
de fano domo.

Trat.

Carbonato de cal dos cucharaditas en el dia con una
amp. de bact. intestifag. cada una.

pan Bre. Uinas a xxx gotas desp. de c. alimento, 2 compri-
midos de peptamilas después de la cena.

Luparicina 0.03/una tableta a las 19.

fano domo una tableta a las 23.

Julio 7/33

P.B.	29.74	29.70
T	62	60
H.	68	74

Tc. normal

Emoc normal

E físicas 0

táctico 0

Cognac 2 copulas

vinos rojos 1/2 copa

Café 0.

alimentos: asados, huevos, palomas, jamón, filete = grasos
manteca y mantequilla, hidrocarbonados seis tortillas,
cuatro galletas de soda, jugos de frutas, infusion de
anis azucarada.

signos: depresión, astenia, sensación constante de
dolor en el epigastrio, a las 6 de la tarde sensación
de hambre anisosa, (se dieron hidrocarbonados)

abdomen globoso, timpanismo generalizado encuentran
se extensa area de timpanismo tambien en el me-
so-gastrio.

tensiones arteriales tomadas en la noche Mx 115 Uled 80 Ula 60
Tratamiento: - ^{espasticidad arterial exagerada.} Edico a las 10.45 injec. sedol termino a las 11.40 inad al
en la mañana med tónica: injec de cortical y antasthen ^{conso r. inf}
evacuante. Nujol ^{glorab. p. inf}

Neutralizante de la acidez de fermentacion Catl de cal 2 cuchar en el dia con
digestiva: pancreo tina 300 gotas tis y peptamylasa 4 tabl en el dia
espasmodicos: una tableta de euparinas a las 16.30 y otra
a las 21.

Julio 8/33

P. B. 29.70 29.72
T 66° 60°
H 74 74

TC normal

Em. normal

E físico: reposo en un sillón

tabaco 0

Cognac dos copitas

vinos, una copa

café el de la leche

alimentos: jugos de frutas, leche, dulce de duraznos, cordones
filete, jamon, manteca y mantiguilla inf rancaradas.

Síntomas:

gases ++

Enferma
sueños: durmió 9 horas: sensación de alivio al despertar
evacuación abundante producida por un lavado intestinal
que se puso a las 21.30. Sin dolorosa al palpar el
bazo derecho: dolor ligero epigástrico después de la comida
Trat.: principal

lactario fago

jugos de ajo

stáblita de euparacina a las 17.

stáblita de fano druma a las 21.30

lavado intestinal evacuante.

Julio 9/33

P.B.	29.84	29.82
T.	66°	66°
H.	74.	68°

Tc. normal
Em med. placentária
E físico o

9 horas de sono.

Julio 10

P.B. = 29.8 29.8

Temp. = 74° 64°

Humedad = 54 (normal) 72 H.

T.C. - Normal. (platica con Bowmann)

Emociones - Placenteros - Baño mar con "Codoorny"

Tabacos - 2 cigarillos un poco prolongados

Cognac - una copita

Vino rojo - una copita

una taza - Café Euforia toda la Tarde,
al cerrar la noche Temor al Cólico.

alimentos - caldos de legumbres, ensalada de
tortillas - Tostadas, jamón, pollo, huevos

jugo de naranja melón

gases ++ ~~Se~~ Durmió de las 9³⁰ a las 12⁵⁰

~~Se~~ Cólicos a las 12⁵⁵ bruscos que lo despertó
de un sueño profundo. Dolores intensos que por momentos se exa-
cerbaban, por momentos se calmaban; pero de violentos desas-
rrollos. Situado región angular derecha. Color, vivadísimo, atón-
o. Ruido de Tripas, abdomen blando, ligero tim-
bre. Tratamiento - 15 gotas de Panisero. Pulso 60 x m.

Carb. Cal. pep. ~~Tratamiento~~
Sedul

Se volvió a Calmar a las 2⁴⁵
Durmió de nuevo de las 4 a las 8 am.
pero nuevo Favodorny; ~~hacia el lado izquierdo;~~
y a l. - T. c. l. - derecha. ~~generalizado~~

La Crisis termina con abundante emisión de orina decolorada y

Julio 11

107

P.B. 29.89.

H. 74

T. 66°

P.B. - 29.86

H. - 74

T. - 62°

Viaje a L. Pres. Rodriguez. 2
Taz. de café al levantarse. Euforin.
Viaje por el de cerca de 6 horas ida y
vuelta. Causa miofisica, pesadez de cabeza
un Cognac, una cerveza Cat. Blanc (1/4) y 2 ci-
garros. Regreso a las 4⁴⁵ Comid. Compuesta
de Cild. de granos de fideo, Conejo, tortillas, jugo
Naranja, por de café. Se acuesta a las 5³⁰
Lavado intestinal enmanente. Comed. Co-
munal el Carb. Cal. Amilidiastasa, Panes
Kin as. Son las 6 pm: Espera el ramalazo.
Con calma y listo para obrar.

A las 7⁴⁵ Carb. Cal. Ha descansado,
dormido algo y contestado su Correspondencia.
Euforin a las 8 pm. Cena a las 8⁴⁰
(Jamón, jugo Naranja, Tortilla, Café con leche poco)
Gases ++ Inminencia de colic.
Repetir la Frase de Ney: ¡Que Dios nos

Guarde esta Noche!

Despertó de los 9 $\frac{1}{4}$ a los 11 $\frac{1}{5}$.

El colico es inminente. $\frac{1}{2}$ amp. de
Atropina. La formación y expulsión de gases + + + +

Va' al excremento, dos oves y arrojó gran
parte del lavado. Fue seguramente por haber sido
puerto según instrucciones no por bazo, de los
retenidos. Lo que arroja es espesivamente
fétido parecido al olor a ajo. de color
amarillo oro. Parecen calibrarse los dolores

para arrear ^{si tuare en el epigastro irradiando al dorso} y Ser Nervioso a los 12 $\frac{40$
min. de Bedol a pesar de haberse querido
pasar sin ella. Pero será que la Crisis
se prolonga. La Crisis se terminará

a los 2 ^(Vómitos de Crisis que ha tratado - visto durante el día) Con abundante orina poco concentrada
y comenzó en los oídos. Duerme hasta las

6 $\frac{1}{2}$ - A las 6 $\frac{1}{2}$ un pildorita a las
del "Dr. Almad" y a las 8 $\frac{1}{2}$ 2 cuchar
raditas de aceite piños.

Lavado 3 $\frac{1}{2}$ Evacuación. Descansa.

P.B. 29.84.

Jul 12

T. 74

H. 68°

P.B.

T.

H.

Receivements després de la grande Confé-
rence avec Chandler & Buntingham.
A la suite Cartwright & Dartmouth.

En la réunion Sup. Torontó & the

En la Tarde (2 pm - 7 pm - 10 pm)

Simtomas: **Dolores abd.** meterrisus cólicos, insomnio

~~Los~~ Dolores abdominales. = Se presentan siempre por crisis, de horario fijo, unas veces, las menos ~~en~~ en las primeras horas de la Noche; otras veces, las más, en la madrugada (entre las 2 y las 3 Horas). ⁽¹⁾ La ~~aparición~~ ~~del dolor~~ ~~es brusca~~. Inicialmente el dolor se localiza en el ~~hipocóndrio derecho, pero~~. El dolor es punzitivo, aparece bruscamente, se localiza al iniciarse en el hipocóndrio derecho, después en el mesogastrio y en el hipocóndrio izquierdo. Su intensidad va aumentando rápidamente hasta hacerse peritonitis, localizándose entonces en el epigastrio, con irradiación constante a la Columna vertebral y excepcional al brazo izquierdo. Coexisten con ~~Meterrisus cólicos~~ ^{aerocolia} todas las crisis dolorosas. ~~El dolor~~ ~~es~~ ~~localizado~~ ~~parcial~~ que se ~~manifiesta~~ reconoce por borrigunos, distensión del vientre, Aumento de la tensión abdominal, y temblor exagerado.

Cuando el dolor es muy intenso se acompañan además de vómitos de alimentos y de bilis, palidez del rostro, estado lipotímico, bradicardia, bradipnea y arritmia respiratoria y poliosis en emisión de vómitos muy ~~clara~~ por concentrados.

Separados estas Crisis por intervalos variables, desde un día ⁽¹⁾ hasta 22.

~~A Continuar~~ fecha de la Crisis y Caracteres, e in-
cipales en cada una de ellas. (Anex. N.º 1)

faciéndolo extremo. 1.^a Sedol a las 7³⁰ pm. 110

2.^a con a las 11³⁰ pm.

~~10~~ 10 abril. - Cólicos en meteorismo generalizado.
Aument. de la tensión abdominal.
Timpanismo metálico en ambos
hipocondrios. (cedió en menos de
media hora con Sedol).

8 Mayo. - Cólicos ligeros que no aume-
ntó. inyecc. de Sedol. ~~Cedió en~~
Desaparición después de
un lavado evacuante.

15 Mayo. - Cólicos que cedieron pronto
después de inyectarle Sedol.
Este cólico tuvo irradiación al
dorso; meteorismo frías y ausencia
de vomitos.

6 de Junio. - (Conferencia Melchor Ortega). - Cólicos a
las 22 hrs - Gases +++++
Se quitó a las 22⁴⁰ después de ser
inyectado con Sedol a las 22⁵

10 de Junio. - Cólico repentino muy intenso, ^{irradiación al dorso,}
21 hrs durante la cena. Había Cam- ^{localización epigástrica}
mada a pie más de 3 Kilómetros. ^{decho poco gases}
Se bañó en el mar. Física y moralmente

Día 16 de mayo. = Cólicos - Tratamiento sintomático.
^{nocturnos}
2^a mitad de la noche. = (Opíáceos)

Día 17. = Cólicos nocturnos
2^a mitad de la noche. = Tratamiento sintomático.
(Opíáceos).

Día 19. = 3 Evacuaciones diarreas, vesperales

Día 23 = Cólicos ~~intensivos~~ a las 3 am. Locali-
zación epigástrica, irradiación al
dorso, aparece brusca. Como sinto-
mas concomitantes, ~~distensión~~ ^{meteorismo} abdo-
minal intestinal con distensión
de la mitad derecha del abdomen,
~~en vómitos~~ ^{repetidos vómitos} de alimentos.

Duró 2 horas y requirió la aplica-
ción de 2 amp. de Pedal-
un a las 3 $\frac{1}{4}$ y otra a las 4.

Día 25. = Cólicos a las 3 horas, menos intenso
que el anterior, con la misma localización
e irradiación; Meteorismo en ~~abdomen~~ disten-
sión de la mitad derecha del vientre.

Requirió la aplicación de una amp. de Pedal.

1^o de abril = Cólicos entre 2 y 3 horas con la misma
síntomas. Cedió con opíáceos.

11 de abril = Cólicos a las 7 p.m. de principio brusco
e insperado. ~~Lanzamiento~~ Vómitos
primos de alimentos y luego ~~bilis~~ de
bilis. Irradiación franca al dorso
Diarrea, estado lipotímico. Ogi

Se sentía admirablemente. Se inyectó Sedol III.
a los 21.⁵ - Desapareció a los 21.⁵
~~Chas 23 horas - B...~~

14 de Junio. = Cólicos a las 10 y media hrs.
apareció repentino aumento durante
el sueño. Localización al principio
fue en el hipocóndrio derecho,
después en el ing. de - Inyección de
Sedol. Inyección Sedol que hizo
desaparecer el dolor a las 7 y media hrs.

24 Junio. = Cólicos a las 3 hrs. al principio
de mediana intensidad. Inyección
de Sedol a las 3.²⁵. Se quitó el
dolor a las 3.⁵⁵ para reaparecer
con mayor intensidad, a las
5 horas, localizado en el epigastrio,
con irradiación al dorso y al brazo
izquierdo. Inyección de media amp.
de Cibalgin.

Las crisis dolorosas en general, terminan
con foliculitis. Después queda adolorimiento en
el hipocóndrio;

El desarrollo de gases tiene horario fijo
5½ a 6 hrs después de la Comida principal
y en las madrugadas. Habitualmente ^{la aerocolia} es libre
y distiende ^{uniformemente el abdomen} ~~todo el Colon~~ ^{en otras ocasiones} ~~pero~~ ^{las más veces,} ~~se~~
bloquea y distiende ^{las menos,} el Ciego y Colon ascendente
y ^{las menos,} el Angulo esplénico y el Colon descendente.
Cuando los gases pueden expelerse, se da una
cuenta de la rapidez ~~y cantidad~~ en que se
producen así como de su gran cantidad. ~~Fig.~~
~~Por~~ Por regla general los gases son ino-
doros, aun cuando en ocasiones tienen olor sulfhi-
drico.

~~Este síntoma (el meteorismo), se observó, intermitentemente, del 26 de Mayo hasta el 24 de Junio.~~

Con el fin de estimar cuantitativamente este
síntoma se formó una escala Convencional (de una
a cinco cruces), observándola en minuciosidad
del 26 de Mayo, a la fecha (24 Junio)

26 de Mayo = + + + + + 27 de Mayo = + + + + el 28 = + + +
el 29 = + + + + + el 30 de Mayo = + + + + + el 31 = +
1º de Junio = + 2 de Junio = + 3 de Junio = + el 4 = + el 5 = + +
el 6 = + + + + + el 7 = + + + el 8 = + el 9 = + el 10 = + el 11 = + + +
el 12 = 0 el 13 = 0 14 = + 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 = + + +
23 = + Día 24 en la madrugada = + + + + +.

Con el fin de investigar el origen de los gases
se han estado practicando, examen Coprológicos
sucesivos, ~~en los resultados siguientes.~~
(Anexo nº 2)

~~Insomnio~~

Caracteres del sueño - El paso de la vigilia al sueño es rápido. El primer sueño, incompleto, con inquietud y actividad cerebral manifestada por la articulación de palabras y frases, que se refieren a los asuntos que lo han ocupado en el día. La segunda parte del sueño En su 2ª parte el sueño es completo y profundo, para reaparecer de nuevo los fenómenos de excitación poco antes del despertar. La sensación al fin del sueño es de fatiga ~~ya~~ Como si ese acto no hubiera sido reparador.

La mayor parte de los días hay insomnio y más que otros días hipersomnio.

Valorización aproximativa del insomnio observado durante ~~unos~~ meses comprendidos entre el 24 de May al 24 de Junio.

24 de May.	4 horas de Sueño.	1 Junio	= 7 hrs de Sueño
25 -	5 "	2 "	= 5 "
26 -	3 "	3 "	= 12 (sin hipnótica)
27 -	5 "	4 "	= 0 horas.
28 -	6 "	5 "	= 9 horas.
29 -	6 "	6 "	= 8½ "
30 -	0 "	7 "	= 7 "
31 -	5 "	8 "	= 5 "
		9 "	= 6 "

10 de Junho = 5 hrs de sono.
11 " = 7 " "
12 " = 7 " "
13 " = 10 " "
14 " = 8 " "
15 " = 6 horas.
16 " = 7 horas.
17 " = 9 horas.
18 " = 8 horas.
19 " = 8 horas.
20 " = 9 horas.
21 " = 10 horas.
22 " = 9 horas.
23 " = 0 horas.
24 " = 8½ horas

= Síntomas generales. =

114

Sensación de cansancio muscular y fatiga cerebral. Emotividad exagerada. Astenia y adelgazamiento.

= Exploraciones arteriales y ~~circulatorias~~.
de la circulación. =

Día 19 de Abril. Índices oscilométricos.

Tibiales derechos $\frac{1}{3}$ superior = $2\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$ inferior = $2\frac{1}{2}$

Tibiales izquierdos, $\frac{1}{3}$ superior = $4\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$ inferior = $4\frac{1}{2}$

Día 14 de Mayo. Tensiones generales.

Mx = 120.

Med = 80. Con índice oscilométrico de $5\frac{1}{2}$.

Mn = 60.

Índices oscilométricos.

Tibiales derechos $\frac{1}{3}$ medio de la pierna.

Antes del Baño (abierto) = $2\frac{3}{4}$.

Después del Baño (abierto a $43^{\circ}3$ prolongado durante 10' = $3\frac{1}{2}$

Día 3 de Junio

Tensiones generales.

Mx = 110.

Med = 80. Con Índice oscilométrico de 4.

Mn = 60.

Índices oscilométricos.

Tibiales derechos $\frac{1}{3}$ Sup. pierna = $2\frac{3}{4}$

" " " " $\frac{1}{3}$ inf. " " = $2\frac{1}{2}$

Di. 24 de Junio 2
Sensaciones generales.

Brazo derecho 1ª Tomada.

14 - 0
13^x - buellas.
12^{1/2} - "
12 - "
11^{1/2} - "
11 - "
10^{1/2} - buellas.
9 - Variable: de ¹/₄ en unas pulsaciones a 1¹/₄ en otras.
8^{1/2} - Con un solo brazal - 5.
8 - 5^{1/2}
7^{1/2} - Variable: de 3 en unas pulsaciones, a 5 en otras.
6 - 5.
5 - 4.
4 - 3^{1/2}
3 - 2^{1/2}
2 - 1^{1/2}

Brazo derecho 2ª Tomada

14 - buellas.
13^{1/2} - "
13 - "
12^{1/2} - ¹/₄
12 - ¹/₄
11^{1/2} - Variable: de ¹/₄ a ¹/₂
11 - ¹/₄ a ¹/₂
10^{1/2} - Variable ¹/₄, ¹/₂, 1.
9^{1/2} - Con un solo brazal = Variable de 2 a 3.
9^{1/2} - 4.
9 - 4¹/₄
8^{1/2} - 4¹/₂
8 - 4¹/₂
7^{1/2} - 5¹/₂
7 - 5.

Sensación de ligadura del brazo, no obstante
la descompresión del manguito o brazal
del oscilómetro; y cielos en los
gumeros del antebrazo

3^a Toma

115

a $6\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$.

a 6 — 4.

$5\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$.

5 — $2\frac{1}{2}$.

$4\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$.

4 — $1\frac{1}{4}$.

$3\frac{1}{2}$ — de $\frac{3}{4}$ a 1.

3 — $\frac{1}{2}$

01-

Nota. = Como en esta vez, la reflectividad arterial exagerada y el angiospasmus, se han hecho patentes en otros días; subjetivamente, por la Pensación de Miembros ligados (superiores e inferiores); y por el fenómeno exactamente apreciado, de encontrarse Oscilaciones de la Aguja del Oscilómetro muy variables ^{en la misma Toma, y de una Toma a otra,} ~~en la misma~~ a pesar de ejercerse la misma compresión con el maniquito inflado.

116
Lengua saburral - saburra amarillenta.

sonoridad pulmonar +

ruidos cardiacos débiles.

pulso ampl. media, 70 por m., arritmia respiratoria, hipolimia vascular.

11 Mx 8 Mn 1a. Toma proc. auscultat.

11 Mx 8 Mn 2a. Toma

12 Mx 7 1/2 Mn 3a. Toma.

12 Mx 8 Mn 4a. Toma.

Lengua saturada : saturada amarillenta
Sonoridad pulmonar +
Ruidos cardiacos debiles
pulso ampl media, 70 por m, arritmico
resp. hipotonia vascular

11 Mx 8 Mn 1ª Toma proc. auscultat.
11. Mx 8 Mn 2ª Toma.
12. Utx 7 1/2 Utn 3ª Toma.
12 Utx 8 Mn 4ª Toma.

18

3311AC SA11E F. JAFRO
MEXICO D.F.

- 119
10. de abril. - Cólico entre 2 y 3 horas con los mismos síntomas. Cedió con opiáceos.
- 11 de abril. - Cólico a las 7 p.m. de principio brusco e inesperado. Vómitos primero de alimentos y luego de bilis. Irradiación franca al dorso. Diarrea, estado lipotímico. Agitación extrema. 1a. Sedol a las 7.30 p. m. y 2a. como a las 11.30 p.m.
- 20 de abril. - Cólico con meteorismo generalizado. Aumento de la tensión abdominal. Timpanismo metálico en ambos hipocondrios. (Cedió en menos de media hora con Sedol).
- 8 de mayo. - Cólico ligero que no ameritó inyección de Sedol. Desapareció después de un lavado evacuante.
- 15 de mayo. - Cólico que cedió una hora después de inyectarle Sedol. Este cólico tuvo irradiación al dorso; meteorismo franco y ausencia de vómitos.
- 16 de mayo. - Cólico nocturno; 12a. mitad de la noche. - Tratamiento sintomático (opiáceos).
- 17 de mayo. - Cólico nocturno; 2a. mitad de la noche. - Tratamiento sintomático (opiáceos).
- 19 de mayo. - 3 evacuaciones diarreicas vesperales.
- 23 de mayo. - Cólico a las 3 a.m. localización epigástrica, irradiación al dorso, aparición brusca. Como síntomas concomitantes, meteorismo intestinal con distensión de la mitad derecha del abdomen, repetidos vómitos de alimentos. Duró 2 horas y requirió la aplicación de 2 ampollitas de Sedol, una a las 3 1/4 y otra a las 4.
- 25 de mayo. - Cólico a las 3 horas, menos intenso que el anterior, con la misma localización e irradiación; meteorismo con distensión de la mi-

tad derecha del vientre. Requirió la aplicación de una ampollita de Sedol.

6 de junio. - (Conferencia con Melchor Ortega). - Cólico a las 22 horas.

Gases +++++. Se quitó a las 22.40 después de ser inyectado con Sedol a las 22.5.

10 de junio. - Cólico repentino muy intenso, con irradiación al dorso, localización epigástrica y pocos gases, a las 21 horas, durante la cena. Había caminado a pie más de tres kilómetros. Se bañó en el mar. Física y moralmente se sentía admirablemente. Se inyectó sedol a las 21.5. Desapareció a las 21.50.

14 de junio. - Cólico a la una y media horas. Apareció repentinamente durante el sueño. Inyección de Sedol que hizo desaparecer el dolor a los 40 minutos.

24 de junio. - Cólico a las 3 a.m., al principio de mediana intensidad. Inyección de Sedol a las 3.25. Se quitó el dolor a las 3.55 para reaparecer con mayor intensidad a las 5 horas, localizado en el epigastrio, con irradiaciones al dorso y al brazo izquierdo. Inyección de media ampollita de Cibalgina.

Las crisis dolorosas en general, terminan con poliuria. Después queda adolorimiento en el hipocondrio.

121
Mayo 26 - 1933. insomnio (3 h.) espasmos arter. (osc) aerocolia bloqueada en el ciego.

8 P. B. 29.86 variable	{ G. H. 52 interior 74 intemp.	{ T 74 interior. 60 intemperie.	entero miel aceite brombilia
20 P. B. 29.82 variable	{ G. H. 62 interior 74 intemp.	{ T 70 interior 59 intemperie	

V i e r n e s .

Mayo 27 - 1933. insomnio (5 h.) reflectiv. arter. (osc) aerocolia menor.

8 P. B. 29.84 variable	{ G. H. 59 interior 74 intemp.	{ T 74 interior 59 intemp.	entero carbón caolín miel brombidia aceite inyección extracto tejidos.
20 P. B. 29.88 variable	{ G. H. 54 interior 74 intemp.	{ T 72 interior 56 intemp.	

S á b a d o .

Mayo 28 - 1933. insomnio (6 h.) refl. art. menor. - gases menos.

8 P. B. 29.90	{ G. H. 57 interior 74 intemp.	{ T 72 interior 60 intemp.	entero carbón caolín miel brombidia aceite
20 P. B. 29.90	{ G. H. 54 interior 74 intemp.	{ T 74 interior 58 intemp.	

D o m i n g o .

Mayo 29 - 1933. insomnio (durmió como el día 28) - gases +++++

8 P. B. 29.92	{ G. H. 55 interior 74 intemp.	{ T. 73 interior 62 intemp.	entero carbón caolín miel brombidia codeína.
20 P. B. 29.90	{ G. H. 56 interior 74 intemp.	{ T. 72 interior 60 intemp.	

L u n e s .

Mayo 30 - 1933. insomnio +++++ gases +++++

8 P. B. 29.92	{ G. H. 54 interior 74 intemp.	{ T. 74 interior 62 intemp.	se suprimió el car- bón y el caolín. - Pastilla laxante.
20 P. B. 29.98	{ G. H. 52 interior 74 intemp.	{ T. 72 interior 58 intemp.	

M a r t e s .

Mayo 31 - 1933. durmió 5 h. gases +

8 P. B. 29.96	{ G. H. 50 interior 54 intemp.	{ T. 72 interior 68 intemp.	entero lavado evacuante
20 P. B. 29.94	{ G. H. 46 interior 74 intemp.	{ T. 73 interior 60 intemp.	pancreo- kinasa

M i é r c o l e s .

Junio 10. - 1933. insomnio + (7 h.) gases +

8 P. B. 29.96	{ G. H. 50 interior 62 intemp.	{ T. 72 interior 68 intemp.	entero miel
20 P. B. 29.96	{ G. H. 48 interior 74 intemp.	{ T. 70 interior 58 intemp.	aceite pancreo- kinasa

J u e v e s .

Junio 2 - 1933. durmió 5 h. gases +

8 P. B. 29.94	{ G. H. 52 interior 58 intemp.	{ T. 72 interior 68 intemp.	ácido láctico miel
20 P. B. 29.84	{ G. H. 52 interior 74 intemp.	{ T. 71 interior 63 intemp.	lactona aceite

V i e r n e s .

Junio 3 - 1933. durmió 12 h. sin hipnótico. gases +

8 P. B. 29.88	{ G. H. 48 interior 55 intemp.	{ T. 72 interior 65 intemp.	ácido láctico miel
20 P. B. 29.99	{ G. H. 52 interior 57 intemp.	{ T. 71 interior 59 intemp.	lactona aceite pancreokinasa inyección ext. tejido.

S á b a d o

Junio 4 - 1933. preocup. conf. Dip. y Gral. C. insomnio +++++ gases +

8 P. B. 29.98	{ G. H. 52 interior 57 intemp.	{ T. 71 interior 59 intemp.	purgante ricino bacteriófago
20 P. B. 29.95	{ G. H. 52 interior 68 intemp.	{ T. 71 interior 62 intemp.	dieta hídrica.

D o m i n g o .

Junio 5 - 1933. insomnio + (durmió 9 h.) espasmo 0 - gases ++

8 P. B. 30	{ G. H. 52 interior 72 intemp. }	{ T. 72 interior 62 intemp. }	bacteriófago miel aceite baño de mar	primer día r6 gimen
20 P. B. 29.90	{ G. H. 48 interior 74 intemp. }	{ 72 interior 56 intemp. }	golf recorri do de las huertas.	alimenti cio de prueba

L u n e s .

Junio 6 - 1933. Confer. Melchor Ortega. Cólico a las 22 h.
durmió de 22.40 a 3.05 y de 3.30 a 8 a.m. gases +++++

8 P. B. 30.06	{ G. H. 52 interior 62 intemp. }	{ T. 70 interior 64 intemp. }	ácido láctico lactona miel	
20 P. B. 30	{ G. H. 52 interior 74 intemp. }	{ T. 72 interior 58 intemp. }	sedol, 1 amp. a las 22.5 h. brombilia 60 gotas a las 3 h. y 5 m.	

M a r t e s .

Junio 7 - 1933. durmió 7 h. espasmo intestinal +++++ gases +++

8 P. B. 30	{ G. H. 54 interior 74 intemp. }	{ T. 71 interior 62 intemp. }	nujol fosfato ácido de Hosafor.	
20 P. B. 29.92	{ G. H. 54 interior 74 intemp. }	{ 72 interior 58 intemper. }	1/2 cucharada tres veces al día	

M i e' r c o l e s .

Junio 8 - 1933. juego. - Durmió 5 h. gases +

8 P. B. 29.96	{ G. H. 58 interior 74 intemp. }	{ T. 72 interior 62 intemp. }	nujol aceite fosfat. ácido	
20 P. B. 29.92	{ G. H. 60 interior 74 intemp. }	{ T. 72 interior 58 intemp. }	belladona pamita	

J u e v e s .

Junio 9 - 1933. juego - durmió 6 horas.

8 P. B. 29.90	{ G. H. 52 interior 74 intemp. }	{ T. 74 interior 60 intemp. }	nujol fosf. ácido.	
20 P. B. 29.90	{ G. H. 52 interior 74 intemp. }	{ 72 interior 60 intemp. }	belladona pamita	

V i e r n e s .

Junio 10 - 1933. Cólico repentino muy intenso a las 21 horas. Inmediatamente después cena: jamón y pollo asado y café con leche - baño de mar, visita huerta Gral. Olachea - física y moralmente se - sentía muy bien. - Ejercicio + 1 milla.

8 P. B. 29.92	{ G. H. 53 interior 62 intemp.	{ T. 73 interior 68 intemp.	nujol pamita belladona
20 P. B. 29.90	{ G. H. 54 interior 72 intemp.	{ T. 76 interior 60 intemp.	inyec. sedol a las 21 h. 5 m. brom. a las 11 bromuro a las 3, fano- dormo a las 5.
S á b a d o	durmió 5 horas.		

Junio 11 - 1933. durmió 7 h. gases +++

8 P. B. 29.90	{ G. H. 56 interior 74 intemp.	{ T. 74 interior 66 intemp.	pamita belladona 7 gotas bis. aceite
20 P. B. 29.86	{ G. H. 58 interior 74 intemp.	{ T. 74 interior 58 intemp.	tribromuros 2 tabletas
D o m i n g o .			

Junio 12 - 1933.

8 P. B. 29.88	{ G. H. 56 interior 74 intemp.	{ T. 72 interior 60 intemp.	21 gotas tintura bella- dona en el día - pamita
20 P. B. 29.86	{ G. H. 57 interior 74 intemp.	{ T. 73 interior 56 intemp.	Carbonato de cal, 2 cu- charaditas en el día - 2 tabletas tribromuros.
L u n e s .			

Junio 13 - 1933.

8 P. B. 29.85	{ G. H. 49 interior 62 intemp.	{ T. 72 interior 70 intemp.	
20 P. B. 29.80	{ G. H. 56 interior 74 intemp.	{ T. 72 interior 60 intemp.	
M a r t e s .			

Junio 14 - 1933.

8 P. B. 29.80	{ G. H. 52 interior 74 intemp.	{ T. 72 interior 66 intemp.	
20 P. B. 29.80	{ G. H. 62 interior 74 intemp.	{ 76 interior 64 intemp.	
M i é r c o l e s .			

Junio 15 - 1933

8 P. B. 29.85

{	G. H. 55 interior	{	T. 74 interior
	70 intemp.		68 intemp.

20 P. B. 29.82

{	G. H. 74 interior	{	T. 58 interior
	58 intemp.		73 intemp.

J u e v e s .

Junio 16 - 1933.

8 P. B. 29.86

{	G. H. 54 interior	{	T. 73 interior
	62 intemp.		71 intemp.

20 P. B. 29.80

{	G. H. 56 interior	{	T. 73 interior
	64 intemp.		62 intemp.

V i e r n e s .

Junio 17 - 1933.

8 P. B. 29.80

{	G. H. 54 interior	{	T. 73 interior
	74 intemp.		T. 70 intemp.

20 P. B. 29.80

{	G. G. 58 interior	{	T. 71 interior.

Yodidson 3.50 grms disueltos en
150 cc. de agua de Vichy Hôpital. Una vez
disuelto se agrega agua gaseosa hasta com-
pletar unos 300 cc.

Tomar la bebida 30 minutos después
de una comida compuesta de

Tapioca

papa cocida

té - pan tostado

Enema antes de la comida y antes de
tomar la radiografía

Cena a las 8 pm

Radio . . . 11 am

A las 7.30 pm. una tableta de codeína

A las 8 pm., cena compuesta de arroz cocido, pollo cocido, una taza de té y una tostada.
Nada de grasa.

Inmediatamente después de la cena, el Tetrag-
nost, a pequeños sorbos, de manera de tomar la
totalidad de éste en un cuarto de hora aproxi-
madamente.

(La preparación de la bebida con el Tetragnost,
se efectúa de la manera siguiente: se vierte todo
el contenido del frasco en un vaso y se añade
un poco de agua tibia mezclando hasta que
se forme una pasta homogénea. Logrado esto,
se va añadiendo más agua removiendo
siempre la mezcla, hasta que se tenga un volú-
men de $\frac{1}{4}$ de litro. Sigase removiendo hasta que
la solución que al principio era azul, quede
blanca.)

Después de tomar esta bebida en la forma
indicada, se puede beber un poco de agua, li-
monada, naranja o cualquier jugo de fruta;
pero a la mañana siguiente no se puede tomar
alimento sólido ni líquido antes de efectuada la

radiografía.

Hay que acostarse pronto, procurando permanecer sobre el lado derecho.

Presentarse para la radiografía a las 11 am.

460
2300
460
600

1933

Viaje a Ensenada y estancia en el Sauzal.

Síntomas: Dolores abdominales; meteorismo cólico; insomnio.

Dolores abdominales: Se presentan siempre por crisis, de horario fijo, unas veces, las menos en las primeras horas de la noche; otras veces, las más, en la madrugada (entre las 2 y las 3 horas) separadas estas crisis por intervalos variables, desde un día hasta 22. El dolor es puntitivo. Aparece bruscamente, se localiza al iniciarse en el hipocondrio derecho, después en el mesogastrio y en el hipocondrio izquierdo. Su intensidad va aumentando rápidamente hasta hacerse paroxístico, localizándose entonces en el epigastrio, con irradiación constante a la columna vertebral y excepcional al brazo izquierdo. Todas las crisis dolorosas coexisten con aerocolia que se reconoce por borborismos, distensión del vientre, aumento de la tensión abdominal, y timpanismo exagerado.

Cuando el dolor es muy intenso se acompaña además de vómitos de alimentos y de bilis, palidez del rostro, estado lipotímico, bradicardia, bradipnea y arritmia respiratoria y poliuria con emisión de orinas muy poco concentradas.